

## OBECNÁ DOPORUČENÍ:

- vždy je nutné pokračovat v podávání léků proti bolesti
- vždy je nutné léčit rýmu nosními kapkami nebo spreji (včetně řádného smrkání/odsávání nosní sekrece)
- pokud byl bubínek proříznut a je přítomný výtok ze zvukovodu, je třeba zvukovod čistit
- dítě by mělo zůstat doma a dodržovat klidový režim

## LÉČBA OPAKOVANÝCH ZÁNĚTŮ STŘEDNÍHO UCHA

Při opakovaných zánětech středního ucha by měla být na prvním místě zhodnocena velikost mandlí v nosohltanu (tzv. „nosní mandle“) a vhodnost jejich odstranění. V případě, že se i po odstranění těchto mandlí záněty středního ucha opakují, lze zavést do bubínků malé trubičky, které do středního ucha přivádí vzduch, odvádí případnou tekutinu a snižují množství zánětů po dobu, než jsou uchem samy vyloučeny. Měl by být zhodnocen celkový imunitní stav dítěte.

Pokud se záněty opakují, poraděte se o možném řešení zdravotního stavu Vašeho dítěte se svým praktickým lékařem pro děti a dorost nebo se svým ušním lékařem. Jistě Vám dobře poradí.



ZDRAVÉ  
DÍTĚ



KLINIKA  
OTORINOLARYNGOLOGIE  
A CHIRURGIE HLAVY  
A KRKU



Kontakt:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA  
KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE  
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU**

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

e-mail: [orl@fno.cz](mailto:orl@fno.cz)

**Iúžková část - tel.: 597 375 812  
ORL ambulance - tel.: 597 373 275  
Po-Pá 7.30-15.00**

## AKUTNÍ ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA



Autoři:

K. Zeleník, D. Jančatová, M. Formánek

ISBN 978-80-88159-13-1

## INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

velmi si vážíme volby našeho pracoviště pro ošetření Vašeho dítěte. V následujících řádcích bychom Vám rádi přinesli základní informace o jednom z nejčastějších onemocnění dětí – akutním zánětu středního ucha, o jeho přičinách a možnosti léčby.

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA  
přednosta ORL kliniky FN Ostrava

## NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

### CO JE TO STŘEDNÍ UCHO?

Jedná se o část ucha za bubínkem, která je spojena s nosem sluchovou trubicí. Ve středním uchu se nacházejí sluchové kůstky.

### CO JE AKUTNÍ ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA A JAK VZNÍKÁ?

Nazýváme tak akutní infekční onemocnění, které nejčastěji vzniká při postižení středního ucha viry nebo bakteriemi.

Infekce se dostává do středního ucha z nosu přes sluchovou trubici. Proto zánětu velmi často předchází rýma (zánět v dutině nosní

a v nosohltanu). Zánět často souvisí se zvětšenou mandlí v nosohltanu (tzv. „nosní mandle“).

Při zánětu nejprve dojde k prosáknutí sliznice středouší a zarudnutí bubínu. Pokud organismus počínající zánět nezastaví, dochází k tvorbě tekutiny ve středouší dutině, která může být vodnatá nebo i hnědavá (to v případě postižení bakteriemi).

### JAK SE STŘEDOUŠNÍ ZÁNĚT PROJEVUJE?

Typické jsou místní příznaky, t. j. náhlá a velmi nepříjemná bolesti ucha, či jeho zalednutí. Někdy může být přítomný výtok tekutiny ze středouší zvukovodem (praskne-li bubínek). Mohou být přítomny také horečky. Malé děti jsou plachtivé, nepokojné, trpí nechutenstvím, na ucho si sahají. Velmi často používaný „tlak na ucho“ ke zjištění, jestli se je v uchu přítomen zánět, není známkou zánětu středního ucha.

### CO MÁM DĚLAT, KDYŽ MÉ DÍTĚ BOLÍ UCHO?

Při bolesti ucha by vždy měly být nejprve podány léky proti bolesti, zvláště trvají-li potíže jen několik hodin a nejsou přítomny celkové příznaky (horečka nad 38 °C). Pokud bolest ustala a již se neopakovala, není nutné podstoupit ušní vyšetření, jednalo se nejspíše pouze o podráždění bubínu (nejčastěji při nachlazení). Pokud se bolest opakuje nebo pokud jsou přítomny horečky nebo z ucha vytéká tekutina, je nutné ušní vyšetření.

### KOHO POSTIHUJE AKUTNÍ STŘEDOUŠNÍ ZÁNĚT NEJČASTĚJI?

Onemocnění postihuje nejčastěji děti v předškolním věku, poté je již méně časté. Zánětem může být postiženo jedno i obě uši současně. Průběh může být zvláště u dětí velmi rychlý.

### JAK LÉKAŘ ZJISTÍ, že SE JEDNÁ O AKUTNÍ ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA?

Po odebrání anamnézy se lékař při vyšetření mimo jiné podívá do ucha (otoskopie) a zhodnotí vzhled bubínu. Zdravý bubínek je šedý, má typický vzhled a připomíná pergamenný papír (obr. 1). Bubínek změněný zánětem mívá změněnou barvu i tvar (obr. 2). Vyšetření u malých dětí není snadné, vyžaduje značnou zkušenosť lékaře.



UŠNÍ  
BUBÍNEK  
PŘI AKUTNÍM  
STŘEDOUŠNÍM  
ZÁNĚTU

### LÉČBA AKUTNÍHO ZÁNĚTU STŘEDNÍHO UCHA

Při vyšetření dítěte se lékař podle nálezu rozhodne, zda doporučí:

- pouze místní léčbu, tzn. léčbu uklidňujícími ušními kapkami
- proříznutí bubínu a uvolnění tekutiny ze středouší
- nasadí celkovou antibiotickou terapii