

## PIIINP pro monitorování vedlejších účinků terapie methotrexátem (MTX)

Rádi bychom Vás informovali, že od **4.4.2018** zavádíme novou metodu

### PIIINP (N - terminální propeptid prokolagenu III).

Vyšetření se provádí z krve pacienta odebrané do standardní odběrové soupravy se separačním gelem. Zvláštní preanalytická příprava pacienta není nutná. Na žádanku ÚLD-OKB napsat požadavek na vyšetření jako PIIINP.

Podle pokynů „PIIINP Guidelines for monitoring on fibrosis in MTX therapy“ publikovaných v *The Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology (2009)* je doporučováno při léčbě **JEADV Guidelines (2009)**: pokud je pacient léčen methotrexátem, PIIINP by mělo být stanoveno před zahájením terapie a následně každé 3 měsíce. Komplikací léčby MTX může být jaterní fibróza.

<b>PIIINP Guidelines pro monitorování fibrózy při terapii MTX</b>		
Před zahájením terapie MTX	> 12,2 µg/l	Indikace k vyšetření ELF skóre nebo biopsii jater
3x během 12 měsíců v průběhu terapie MTX	>6,7 µg/l	Indikace k vyšetření ELF skóre nebo biopsii jater
3x během 12 měsíců v průběhu terapie MTX	>15,3 µg/l	Indikace k vysazení terapie MTX

**Indikace:** při léčbě MTX ve všech medicínských oborech.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Kolektiv ÚLD.