



*Radiodiagnostický ústav FNO*

# PŘÍPRAVA PACIENTA K NĚKTERÝM VYŠETŘENÍM

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1 - Domov sester             | 9 - Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí |
| 2 - Poliklinika              | 10 - Klinika nukleární medicíny               |
| 3 - Krevní centrum           | 11 - Onkologická klinika                      |
| 4 - Diagnostický komplement  | 12 - Pavilon péče o matku a dítě              |
| 5 - Ústav soudního lékařství | 13 - Dětský pavilon                           |
| 6 - Monoblok - lůžková část  | 14 - Ústav patologie                          |
| 7 - Helloport                |   |
| 8 - Infekční klinika         |   |

**Kontakt:**  
**Fakultní nemocnice Ostrava**  
**17. listopadu 1790**  
**708 52 Ostrava-Poruba**



**Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, milí kolegové,**  
vaší snahou je správně léčený pacient a k tomu často využíváte našich služeb. My usilujeme o správné vyšetření pacienta, což ovlivňuje postavení diagnózy a nastavení odpovídající terapie. Výsledek vyšetření je především závislý na správné přípravě pacienta. Chtěli bychom v základních bodech uvést podmínky přípravy k některým vyšetřením prováděným v RDG ústavu FNO. Popis přípravy pacienta k vyšetřením i popis jednotlivých vyšetření můžete také najít na webu FNO [www.fno.cz](http://www.fno.cz), (zdravotnická pracoviště - ústav radiodiagnostický - informované souhlasy). Těšíme se na další spolupráci.

Lékaři Radiodiagnostického ústavu FNO



### **Pasáž gastrointestinálním traktem**

- pro **vyšetření hlitanu** několik hodin před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit, nežvýkat žvýkačku,
- pro **vyšetření jícnu** - nalačno, 6 hodin před nepít alkohol a nekouřit,
- pro **vyšetření žaludku a tenkého střeva** - od půlnoci nejíst, nepít, 6 hodin před vyšetřením nekouřit, nežvýkat (jinak se zvyšuje sekrece žaludeční šťávy, která zhoršuje kvalitu vyšetření).

Při vyšetření jodovou kontrastní látkou 2 hodiny před vyšetřením pacient požije 2 tablety Dithiadenu (kontrastní látka obsahuje jodové soli). Po užití Dithiadenu pacient nesmí několik hodin řídit ani obsluhovat stroje.

### **Enteroklýza**

8 hodin před vyšetřením nejíst, nežvýkat, nekouřit.

### **Irigografie**

#### **2 dny před vyšetřením:**

bezezbytková strava (vynechat nadýmavou stravu - luštěniny, syrová zelenina, ovoce, čerstvé a celozrnné pečivo, maso, zcela vynechat mléko a všechny mléčné výrobky), pít hodně tekutin (rostlinné šťávy, džusy, bujóny, polévky, vyhnout se nápojům obsahujícím CO<sub>2</sub>).

#### **Den před vyšetřením:**

- lehká snídaně,
- k obědu jen čistá polévka (bujón),
- dále jen tekutiny (na celý zbytek dne asi 2,5 - 3 l, mléko ne!),
- časné odpoledne vypít vyprazdňovací roztok (např. Fortrans - použití vysvětlí lékař, který k tomuto vyšetření pacienta odesílá),
- večer před vyšetřením nebo ráno očistné klyzma (nálev 1 - 2 l vlažné vody do konečníku) s následným řádným vyprázdněním.

#### **Ráno v den vyšetření:**

- přijít nalačno.

### **Defekografie**

Večer i ráno před vyšetřením čípek do konečníku k vyprázdnění.

### **CT vyšetření**

Min. 4 hodiny před vyšetřením nejíst, pacient může pít vodu a užívat nezbytné léky, večer a ráno před vyšetřením užít po 1 tbl. Dithiadenu. Po užití Dithiadenu pacient nesmí několik hodin řídit ani obsluhovat stroje.

### **CT vyšetření - virtuální koloskopie**

#### **Dva dny před vyšetřením:**

- jíst pouze bezezbytkovou stravu.

#### **V den vyšetření:**

- lačnit.

#### **Asi 12 hodin před vyšetřením:**

- popíjet zhruba 4 l roztoku Fortrans (1 litr roztoku na 15 až 20 kg tělesné hmotnosti) rychlostí 1 litr za hodinu po dobu 3 - 4 hodin,
- před vyšetřením rovněž užít 2 tbl. Dithiadenu.

### **MR vyšetření**

2 - 3 hodiny před vyšetřením nejíst, nepít, nekouřit.

### **Mamografie**

Doporučuje se před vyšetřením nepoužívat na oblast prsů a podpaží kosmetické přípravky pro možnost vzniku artefaktů na snímku.