

## Žádanka na vyšetření hladin antibiotik při dialýze

Nemocnice:		Oddělení:		Tel. č.:	
Lékař:		IČZ:	Odbornost:		
Kód diagnózy:		Pojišťovna:		Č. účtu:	
Jméno pacienta:				Rodné číslo:	
Hmotnost:	Výška:	kreatinin <sup>*)</sup> :	urea:	CRP <sup>*)</sup> :	
Mikrob:		MIC:	Dialýza:	<input type="checkbox"/> akutní <input type="checkbox"/> chronická	

Datum odběru:		odběr před HD v:	hod.
antibiotikum nasazeno dne:		Odběr po HD (před podáním) v:	hod.
délka dialýzy (od - do):	hod.	čas podání v:	hod.
frekvence dialýzy:		odběr po podání v:	hod.
Důvod vyšetření:		Indikace:	
<input type="checkbox"/> 1. vyšetření		<input type="checkbox"/> endokarditida	
<input type="checkbox"/> opakované vyšetření		<input type="checkbox"/> meningitida	
<input type="checkbox"/> kombinace s léky ototoxickými a nefrotoxickými		<input type="checkbox"/> infekce urotraktu	
<input type="checkbox"/> podávání ATB více než 10 dnů		<input type="checkbox"/> sepse	
<input type="checkbox"/> jiné důvody, jaké:		<input type="checkbox"/> ventilátorová pneumonie	
		<input type="checkbox"/> jiná:	

Antibiotikum:	<input type="checkbox"/> amikacin	<input type="checkbox"/> gentamicin	<input type="checkbox"/> vancomycin	<input type="checkbox"/> meropenem
	<input type="checkbox"/> piperacilin/tazobactam	<input type="checkbox"/> ceftazidim	<input type="checkbox"/> cefotaxim	<input type="checkbox"/> cefepim
Dávka:	Interval podávání:	způsob aplikace:	<input type="checkbox"/> infuze - délka _____ hod. <input type="checkbox"/> i.m.	

Další léky (přípravek, dávkování):

Poznámka:

**Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační.**

Odběr provádějte nejlépe 2. - 3. den po nasazení antibiotika (v indikovaných případech, zejména u kriticky nemocných nebo akutně dialyzovaných již při 2. dávce). 1. vzorek odeberte před zahájením dialýzy, 2. vzorek těsně před podáním antibiotika a 3. vzorek za 30 minut po dokapání infuze nebo 1 hodinu po podání i. m., nejlépe z periferní žíly (z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno). **U beta-laktamových antibiotik odebírejte 1. vzorek před zahájením dialýzy a 2. vzorek těsně před podáním antibiotika.**

<sup>\*)</sup>Sérový kreatinin a CRP odebírejte nejlépe v den odběru hladin antibiotik a výsledek dodejte telefonicky, jinak uvádějte sérový kreatinin a CRP stanovené 1 den před odběrem hladin antibiotik.