

## Žádanka na vyšetření hladin antibiotik

Nemocnice:		Oddělení:		Tel. č.:	
Lékař:		IČZ:		Odbornost:	
Kód diagnózy:		Pojišťovna:		Č. účtu:	
Jméno pacienta:				Rodné číslo:	
Hmotnost:	Výška:	kreatinin <sup>*)</sup> :	urea:	CRP <sup>*)</sup> :	

Datum odběru:		odběr před podáním v:		hod.	
antibiotikum nasazeno dne:		čas podání v:		hod.	
Mikrob:	MIC:	odběr po podání v:		hod.	
Důvod vyšetření:			Indikace:		
<input type="checkbox"/> 1. vyšetření			<input type="checkbox"/> endokarditida		
<input type="checkbox"/> opakované vyšetření			<input type="checkbox"/> meningitida		
<input type="checkbox"/> snížená funkce ledvin			<input type="checkbox"/> infekce urotraktu		
<input type="checkbox"/> CVVH			<input type="checkbox"/> seps		
<input type="checkbox"/> kombinace s léky ototoxickými a nefrotoxickými			<input type="checkbox"/> ventilátorová pneumonie		
<input type="checkbox"/> podávání ATB více než 10 dnů			<input type="checkbox"/> jiná:		
<input type="checkbox"/> jiné důvody, jaké:					

Antibiotikum:	<input type="checkbox"/> amikacin	<input type="checkbox"/> gentamicin	<input type="checkbox"/> vancomycin	<input type="checkbox"/> meropenem
	<input type="checkbox"/> piperacilin/tazobactam	<input type="checkbox"/> ceftazidim	<input type="checkbox"/> cefotaxim	<input type="checkbox"/> cefepim
Dávka:	Interval podávání:	způsob aplikace:	<input type="checkbox"/> infuze - délka hod.	
			<input type="checkbox"/> i.m.	

Další léky (přípravek, dávkování):

Poznámka:

**Tučně zvýrazněné položky jsou nezbytné pro interpretaci výsledků. Hmotnost uvádějte alespoň orientační.**

Odběry provádějte nejlépe 2. - 3. den po nasazení (v indikovaných případech, zejména u kriticky nemocných nebo akutně dialyzovaných již při 2. dávce); 1. odběr = těsně před podáním, 2. odběr = za 30 minut po dokapání infuze nebo 1 hodinu po i.m. aplikaci; vždy pokud možno z periferní žíly a z jiného místa, než bylo antibiotikum aplikováno.

**U beta-laktamových antibiotik odebírejte pouze 1 odběr pokud možno těsně před aplikací ranní dávky.**

<sup>\*)</sup> Sérový kreatinin a CRP odebírejte nejlépe v den odběru hladin antibiotik a výsledek dodejte telefonicky, jinak uvádějte sérový kreatinin a CRP stanovené 1 den před odběrem hladin antibiotik.